

## **HUIDBIOPT**

Samen met de dermatoloog heeft u besloten tot één biopt (of meerdere biopten) op de poliklinische operatiekamer van de kliniek.

Een huidbiopt is het wegnemen van een klein stukje huid voor pathologisch onderzoek (= microscopisch onderzoek). Dit stukje huid wordt door middel van een biopteur, een soort appelboortje, uit de huid weggenomen. De grootte van het biopt hangt af van de plaats en wat de dermatoloog wil onderzoeken.

Een huidbiopt wordt afgenomen als:

- Er een huidafwijking is waarvan niet helemaal duidelijk is wat het is. Het is dan nodig om een stukje van de huid onder de microscoop te onderzoeken.
- Soms wordt een excisie-biopt verricht, dan wordt de huidafwijking in één keer totaal verwijderd door middel van een huidbiopt.

Regelmatig vindt een huidbiopt plaats tijdens uw eerste bezoek op de kliniek.

### **Vorbereiding**

Neem uw actuele medicatie-overzicht mee. Is er in uw medicijngebruik iets veranderd, vertel het dan aan de dermatoloog of de verpleegkundige.

### **De procedure**

- De dermatoloog zal ter controle een time-out procedure volgen. Hierbij wordt gevraagd naar: uw naam en geboortedatum, of u allergisch bent voor bepaalde medicatie en of u een pacemaker of ICD-kastje draagt.
- Met een speciale stift wordt het te verwijderen stukje huid afgetekend.
- Vervolgens wordt het gebied verdoofd door buiten de afgetekende afwijking verdovende vloeistof in de huid te spuiten met een zo dun mogelijke naaldje. Dat kan een branderig gevoel geven. De lokale verdoving werkt normaal gesproken meteen. Als u een andere ervaring heeft geef dat dan aan, dan kan de verdoving langer intrekken. Als u bloedverdunners gebruikt wordt er vaak voor gekozen de verdoving 20 tot 30 minuten in te laten trekken. De in de verdovingsvloeistof aanwezige adrenaline geeft vasoconstrictie (vaatsamentrekking) waardoor de huid na afname van het biopt minder bloedt.
- Daarna wordt het biopt er met de biopteur uitgehaald.
- Het ontstane wondje wordt behandeld met een speciale vloeistof of met een wit “sponsje” die het bloed doet stollen. Zelden is het nodig om een hechting te plaatsen.

### **Na de procedure**

Na een procedure adviseren wij u zelf geen auto te rijden of te fietsen. Het wondje dient u 72 uur droog te houden. Als er verband is aangebracht kan dat na 1 à 2 dagen verwijderd worden. Daarna mag de wond spatwater nat worden.

Als er een “wit sponsje” is gebruikt is het de bedoeling dat u dat laat zitten, dat lost vanzelf op.

Indien meegekregen: 3 x daags antibacteriële zalf of crème smeren.

# Patiënten informatie

Biopt

Als er gehecht is wordt er een vervolgspraak gemaakt om de hechtingen te verwijderen en om de uitslag van het pathologisch (microscopisch) onderzoek te bespreken. Met sommige patiënten wordt een telefonische afspraak gemaakt.

## Mogelijke complicaties

- Mocht de wond binnen 24 uur wat bloed of vocht doorlekken, dan is dat geen probleem. U kunt gerust het wondje afdrukken zoals u is uitgelegd: met een schone vinger en een verbandje het gaatje afdrukken. Neem zo nodig contact op met de kliniek.
- Over het algemeen geneest een rond gaatje in de huid heel mooi en laat een glad en vaak onopvallend litteken achter. Hoe het litteken er uiteindelijk uitziet verschilt per persoon en kan tegenvallen.
- Wanneer het wondje pijnlijk is, rood en dik wordt en/of gaat kloppen en pussen, is er sprake van een infectie. Neem ook dan contact op met de kliniek.

## Tot slot

Heeft u na het lezen van informatie nog vragen, neem dan contact met ons op.