

SHAVE-EXCISIE

Samen met de dermatoloog heeft u besloten tot een shave-excisie in de poliklinische operatiekamer van de kliniek. Regelmatig vindt een shave-excisie plaats tijdens uw eerste bezoek aan de kliniek.

Vorbereiding

Neem uw actuele medicatie-overzicht mee. Eventuele veranderingen van de medicijnen graag vooraf doorgeven aan de dermatoloog of assistente.

Gebruikt u bloedverdunners dan bestaat de mogelijkheid dat u gevraagd bent een half uur vóór de ingreep aanwezig te zijn. Is uw bloedverdunnersgebruik niet ter sprake gekomen, meldt het dan aan de assistent(e). Gedurende één week voor de ingreep dient u gebruik van alcohol tot een minimum te beperken.

De behandeling

- De dermatoloog zal ter controle een time-out procedure volgen. Hierbij wordt gevraagd naar uw naam en geboortedatum, of u allergisch bent voor bepaalde medicatie en of u een pacemaker of ICD-kastje draagt.
- Met een speciale stift wordt zo nodig de te verwijderen huidafwijking afgetekend.
- Vervolgens wordt het afgetekende gebied verdoofd door buiten de afgetekende afwijking verdovende vloeistof in de huid te spuiten met een zo dun mogelijke naaldje. De lokale verdoving werkt normaal gesproken meteen. Als u een andere ervaring heeft geef dat dan aan dan kan de verdoving langer intrekken. Als u bloedverdunners gebruikt wordt er vaak voor gekozen de verdoving 20 tot 30 minuten in te laten trekken. De in de verdovingsvloeistof aanwezige adrenaline geeft vasoconstrictie (vaatsamentrekking) waar door de huid gedurende de excisie minder bloedt.
- De huidafwijking wordt volgens het afgetekende patroon ge-shaved (= gepeld/geschaafd)
- De huidafwijking is dan verwijderd. Kleine bloedende vaatjes worden gestelpt door ze dicht te drukken met een speciale vloeistof of dicht te branden.
- Hechten is bij deze methode niet nodig.

Na de behandeling

Uw reactievermogen kan onder invloed van spanning en medisch handelen verminderd zijn. Na de behandeling adviseren wij u zelf geen auto te rijden of te fietsen. Zorg dat iemand u naar huis brengt.

Het is mogelijk dat u pijn krijgt; zo nodig kunt u driemaal daags twee tabletten van 500 mg paracetamol innemen. Er wordt met u een vervolgspraak gemaakt om de uitslag van het pathologisch (microscopisch) onderzoek te bespreken. Mochten zich onverhoopt problemen voordoen, dan kunt u contact opnemen met de kliniek.

Behandeling van de wond

Als er verband is aangebracht, dan mag u dat na één dag verwijderen. De wond hoeft niet droog gehouden te worden. Het is juist goed om dagelijks kort met de douchekop af te spoelen. Na het

Patiënten informatie

Shave excisie

spoelen adviseren wij u de wond droog te deppen met goed absorberende keukenrol en zo nodig te verbinden. Enkele dagen na de behandeling zal zich een korst op de wond gevormd hebben. De wond hoeft dan niet meer verbonden te worden. Breng indien voorgeschreven driemaal daags fucidinecrème aan.

Mogelijke complicaties

- Als restverschijnsel na shave-excisie kan de huid lichter of donkerder verkleuren.
- Wanneer tijdens de periode van vochtafscheiding het behandelde huidgebied rood, dik en pijnlijk wordt of wanneer de afscheiding gelig (pussend) wordt, bestaat de kans dat er sprake is van een bacteriële ontsteking. In dat geval kunt u contact opnemen met de kliniek.
- Over het algemeen geneest een shave-excisie heel mooi en laat een glad en vaak onopvallend litteken achter. Hoe het litteken er uiteindelijk uitziet verschilt per persoon en kan tegenvallen.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen dan kunt u contact opnemen met de kliniek.